

		Pathologie	Fréquence d'utilisation USI, personnel, produits (de 0 à 10)	Durée de mobilisation USI, personnel, produits (de 0 à 10)	Durée de mobilisation hospitalisation classique (de 0 à 10)
	<b>SPÉCIALITÉ – MÉDECINE INTERNE</b>				
Degré d'urgence 1	Immédiat, aigu, risque vital ou menace sur un organe, un membre	<u>PATHOLOGIE*</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Choc septique dû à une infection bactérienne</li> <li>• Choc anaphylactique ou angio-œdème chez des patients présentant des réactions immunoallergiques</li> </ul> <u>INTERVENTIONS**</u> Thérapie parentérale, thérapie AB, éventuellement intubation et ventilation	8	8	9
Degré d'urgence 2 <sup>oo</sup>	Aigu, état qui se détériore, potentiellement risque vital ou menace sur un organe ou un membre	<u>PATHOLOGIE</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fièvre chez un patient immunodéprimé (p.</li> </ul>	6	6	7

	Intervention dans un délai se chiffrant en heures	<p>ex. immunosuppresseur pour maladie auto-immune, cancer) ou chez un patient atteint du VIH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infections spécifiques (p. ex. méningite, endocardite, malaria sévère,...)</li> <li>• Problèmes chez des patients atteints d'immunodéficience acquise</li> </ul> <p><u>INTERVENTIONS</u></p> <p>ABthérapie, évaluation bactériologique</p>			
Degré d'urgence 3 <sup>°°</sup>	<p>Accélééré</p> <p>Intervention dans un délai se chiffrant en jours</p>	<p><u>PATHOLOGIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fièvre d'origine inconnue</li> <li>• Infection de prothèse</li> <li>• Pathologie infectieuse (Lyme, TBC,...)</li> <li>• Maladies auto-immunes (apparition) telles que:</li> </ul>			8

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lupus</li> <li>○ Sarcôïdose</li> <li>○ Vascularite</li> <li>○ Behçet</li> <li>○ Pancréatite / hépatite auto- immune</li> <li>○ Maladie de Crohn/colite ulcéreuse</li> <li>● Maladies endocriniennes (p. ex. hyperthyroïdie,...)</li> <li>● Diabète déséquilibré avec hyperglycémie mal contrôlée</li> </ul> <p><u>INTERVENTIONS</u> Analyses complètes de sang et d'urine Échographie abdominale Imagerie médicale Endoscopie Anatomopathologie: biopsies Modification du traitement médical</p>			
Électif A+	Affection qui, si elle n'est pas traitée dans un délai de quelques mois, peut	<p><u>PATHOLOGIE</u> Pathologies allergiques Troubles fonctionnels</p>			5

Électif B++	<p>entraîner des dommages pour la santé &lt; 3 mois Planifié, en tenant compte de la capacité des hôpitaux et de la flexibilité nécessaire à la conversion de la capacité dans le cadre de la crise COVID-19 Vu le faible impact sur la santé, les soins peuvent être reportés sans planification immédiate. &gt;3 mois</p>	<p>Intolérances alimentaires Fatigue chronique:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• SFC</li> <li>• Fibromyalgie</li> </ul>           Immunodéficiences modérées   <u>INTERVENTIONS</u>            Tests sanguins, tests d'allergies            Tests cutanés            Spirométrie            Fonction pulmonaire            Tests respiratoires pour diagnostiquer les intolérances             Perfusion de magnésium + vitamines</p>			
-------------	---	--	--	--	--

**Réserves** : cette liste est indicative et a pour but de fournir un appui. Il reste de la responsabilité du clinicien de tenir compte des spécificités (p. ex. comorbidités) du patient ainsi que de la capacité concrète actuelle et prévue et du contexte de sécurité de l'hôpital. La flexibilité de reconversion de capacité dans le cadre d'éventuelles nouvelles flambées de COVID-19 doit être prise en compte (voir réponse détaillée du Bureau du Conseil supérieur des médecins du 19.04.2020).

**La proposition suppose l'ouverture de consultations** sous réserve de garanties pour toutes les mesures de sécurité (y compris un registre des moyens disponibles).

Les téléconsultations sont encouragées, notamment pour le tri et les renvois par les MG dans le cas de patients dont les plaintes sont vagues.

## **Explication du tableau :**

\*PATHOLOGIE : il s'agit ici chaque fois, pour votre spécialité, d'une liste non limitative d'affections ou de groupes de pathologies spécifiques, classés si possible dans l'ordre de leur fréquence d'apparition.

\*\*INTERVENTIONS : concerne toutes les interventions diagnostiques et thérapeutiques, qu'elles nécessitent ou non une narcose.

° Degré d'urgence 1 :

Implique une urgence telle que l'établissement du diagnostic et le traitement sont prioritaires sur toute autre activité qui, au besoin, est arrêtée à cet effet (immédiatement).

°° Degré d'urgence 2

Se rapporte à toute intervention diagnostique ou thérapeutique qui doit pouvoir avoir lieu dès qu'elle est possible et qu'elle s'inscrit dans le programme. Si nécessaire, le planning de la journée (du jour même) doit être adapté ou allongé.

°°° Degré d'urgence 3

Se rapporte aux actes diagnostiques ou thérapeutiques qui doivent être planifiés le plus rapidement possible à court terme (< 1 semaine).

+ Électif A

Actes diagnostiques et thérapeutiques débouchant sur un plan de prise en charge de la maladie, éventuellement graduel, mais planifié de façon telle qu'il n'entraîne aucune diminution des chances pour le patient, compte tenu de la capacité du moment (avec priorité pour les degrés d'urgence 1, 2 et 3).

Mise en œuvre finale à évaluer et impérativement < 3 mois

++ Électif B

Actes diagnostiques et thérapeutiques n'impliquant aucun risque pour la santé à court ou moyen terme.

Les patients peuvent être vus pour avis même si une planification concrète n'est pas possible dans une période de 3 mois.

Ces actes peuvent toutefois avoir lieu en cas de surcapacité dans les établissements de soins.

En ce qui concerne les colonnes "fréquence" et "durée" attendue d'utilisation de l'USI et la durée d'hospitalisation, les modalités pratiques ad hoc devront être déterminées en parallèle par le médecin en chef en concertation en fonction des possibilités.

L'enquête vise seulement à obtenir un score entre 0 et 10 afin d'avoir une image plus précise des divers éléments.