

		Pathologie	Fréquence d'utilisation USI, personnel, produits (de 0 à 10)	Durée de mobilisation USI, personnel, produits (de 0 à 10)	Durée de mobilisation hospitalisation classique (de 0 à 10)
	ORL				
Degré d'urgence 1	Immédiat, aigu, risque vital ou menace sur un organe, un membre	<u>PATHOLOGIE/problématique *</u> <ul style="list-style-type: none"> - Épistaxis grave avec p. ex. choc hypovolémique <u>INTERVENTIONS **</u> <ul style="list-style-type: none"> - Exploration de l'épistaxis / Ligature endoscopique de l'artère sphéno-palatine - 	(épistaxis) 2 (orbitaire) 1 (intracran) 10	1 0 10	
Degré d'urgence 2	Aigu, état qui se détériore, potentiellement risque vital ou menace sur un organe ou un membre Intervention dans un délai se chiffrant en heures	<u>PATHOLOGIE/problématique</u> <ul style="list-style-type: none"> - Épistaxis grave Complications de rhinosinusite aiguë (avec infection fongique intra-orbitaire /intracrânienne/invasive/sinusite aiguë grave chez des personnes immunodéprimées 			

		<ul style="list-style-type: none"> - Mucocèle infectée - Tumeurs de la région (para)sellaire, nécessitant un accès transsphénoïdal, avec perte visuelle aiguë (apoplexie hypophysaire) <p><u>INTERVENTIONS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Exploration de l'épistaxis / Ligature endoscopique de l'artère sphéno-palatine - Chirurgie endoscopique des sinus (ESS) urgente - Lésion expansive à la base du crâne - Décompression orbitaire 			
Degré d'urgence 3	Accélééré Intervention dans un délai	<u>PATHOLOGIE/problématique</u> <ul style="list-style-type: none"> - Fuite idiopathique ou traumatique de LCS 			

	se chiffrant en jours	<ul style="list-style-type: none"> - - Dacryocystocèle chez le nouveau-né avec détresse respiratoire - Atrésie choanale chez le patient atteint de détresse respiratoire <p><u>INTERVENTIONS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fermeture de fuite de LCS / brèche ostéo-méningée - Correction de l'atrésie choanale par endoscopie - DCR 			
Électif A	Affection qui, si elle n'est pas traitée dans un délai de quelques mois, peut entraîner des dommages pour la santé < 3 mois Soins à planifier, en tenant compte de la capacité de	<p><u>PATHOLOGIE/problématique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mucocèle avec extension orbitaire/ intracrânienne - Tumeurs sinonasales 			

	<p>l'hôpital et de la flexibilité nécessaire pour la reconversion de capacité</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tumeurs de la région (para)sellaire nécessitant un accès transsphénoïdal - Pathologie des sinus inflammatoire étendue co-morbidités importantes impact majeur sur la qualité de vie ou symptômes marqués - Méningo-encéphalocèle sans fuite <p><u>INTERVENTIONS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - FESS - Onco-FESS - Résection de la base du crâne par voie endoscopique - Draf III - Fermeture de fuite de LCS / brèche ostéo-méningée 			
--	---	---	--	--	--

Électif B	Crise COVID-19 Vu le faible impact sur la santé, les soins peuvent être reportés sans planification immédiate >3 mois	<u>PATHOLOGIE/problématique</u> <ul style="list-style-type: none"> - Pathologie des sinus inflammatoire limitée - Obstruction du canal nasolacrimal - Pathologie structurelle - Réserves sur le plan esthétique <u>INTERVENTIONS</u> <ul style="list-style-type: none"> - FESS - Septoplastie - Conchotomie - Adénotomie - DCR - Rhino(septo)plastie 			

Réserves : cette liste est indicative et a pour but de fournir un appui. Il reste de la responsabilité du clinicien de tenir compte des spécificités (p. ex. comorbidités) du patient ainsi que de la capacité concrète actuelle et prévue et du contexte de sécurité de l'hôpital. La flexibilité de reconversion de capacité dans le cadre d'éventuelles nouvelles flambées de COVID-19 doit être prise en compte (voir réponse détaillée du Bureau du Conseil supérieur des médecins du 19.04.2020).

La proposition suppose l'ouverture de consultations sous réserve de garanties pour toutes les mesures de sécurité (y compris un registre des moyens disponibles).

Les téléconsultations sont encouragées, notamment pour le tri et les renvois par les MG dans le cas de patients dont les plaintes sont vagues.

Explication du tableau :

*PATHOLOGIE : il s'agit ici chaque fois, pour votre spécialité, d'une liste non limitative d'affections ou de groupes de pathologies spécifiques, classés si possible dans l'ordre de leur fréquence d'apparition.

**INTERVENTIONS : concerne toutes les interventions diagnostiques et thérapeutiques, qu'elles nécessitent ou non une narcose.

° Degré d'urgence 1 :

Implique une urgence telle que l'établissement du diagnostic et le traitement sont prioritaires sur toute autre activité qui, au besoin, est arrêtée à cet effet (immédiatement).

°° Degré d'urgence 2

Se rapporte à toute intervention diagnostique ou thérapeutique qui doit pouvoir avoir lieu dès qu'elle est possible et qu'elle s'inscrit dans le programme. Si nécessaire, le planning de la journée (du jour même) doit être adapté ou allongé.

°°° Degré d'urgence 3

Se rapporte aux actes diagnostiques ou thérapeutiques qui doivent être planifiés le plus rapidement possible à court terme (< 1 semaine).

+ Électif A

Actes diagnostiques et thérapeutiques débouchant sur un plan de prise en charge de la maladie, éventuellement graduel, mais planifié de façon telle qu'il n'entraîne aucune diminution des chances pour le patient, compte tenu de la capacité du moment (avec priorité pour les degrés d'urgence 1, 2 et 3).

Mise en œuvre finale à évaluer et impérativement < 3 mois

++ Électif B

Actes diagnostiques et thérapeutiques n'impliquant aucun risque pour la santé à court ou moyen terme.

Les patients peuvent être vus pour avis même si une planification concrète n'est pas possible dans une période de 3 mois.

Ces actes peuvent toutefois avoir lieu en cas de surcapacité dans les établissements de soins.

En ce qui concerne les colonnes "fréquence" et "durée" attendue d'utilisation de l'USI et la durée d'hospitalisation, les modalités pratiques ad hoc devront être déterminées en parallèle par le médecin en chef en concertation en fonction des possibilités.

L'enquête vise seulement à obtenir un score entre 0 et 10 afin d'avoir une image plus précise des divers éléments.